

Belangrijke contactinformatie

Naam van arts

Telefoonnummer van arts

Mijn naam

Mijn telefoonnummer

Mijn contactpersoon voor noodgevallen

Telefoonnummer van contactpersoon voor noodgevallen

Informatie voor zorgverleners

Cemiplimab, een antilichaam gericht tegen PD-1, is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd of lokaalgevoerd cutaan plaveiselcelcarcinoom (cutaan squameuzecelcarcinoom, CSCC) die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie.

Cemiplimab kan (ernstige) immuungerelateerde bijwerkingen veroorzaken die van invloed zijn op de huid, longen, darmen, lever, hormoonklieren, nieren en andere delen van het lichaam. Vroege herkenning en gepaste behandeling zijn noodzakelijk om de gevolgen van bijwerkingen te minimaliseren. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van cemiplimab voor details over de detectie en het behandelen van eventuele bijwerkingen.

Patiëntenwaarschuwingskaart CEMIPLIMAB

Informatie voor de patiënt

- Gelieve deze kaart altijd bij u te dragen en deze te laten zien wanneer u een zorgverlener raadpleegt, om hem/haar te informeren over uw huidige behandeling met cemiplimab. Zorg er altijd voor dat u zo snel mogelijk alle symptomen van bijwerkingen aan uw arts meldt. Voorbeelden van tekenen of symptomen die voor kunnen komen bij gebruik van cemiplimab staan later op deze kaart vermeld.
- Probeer geen symptomen zelf te behandelen zonder eerst uw arts te raadplegen.
- Neem contact op met uw arts als u last krijgt van (erger wordende) bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Voorbeelden van tekenen of symptomen waarvoor u de arts onmiddellijk dient te raadplegen:

Huidproblemen

- Uitslag of jeuk
- Blaarvorming van de huid
- Zweren in de mond of van andere slijmvliezen

Longproblemen (pneumonitis)

- Nieuwe of erger wordende hoest
- Kortademig zijn
- Pijn op de borst

Darmproblemen (colitis)

- Vaak diarree, vaak met bloed of slijm
- Vaker stoelgang dan normaal
- Ontlasting die zwart of teerachtig is
- Ernstige pijn in de maag (buik) of gevoeligheid

Leverproblemen (hepatitis)

- Het geel worden van uw huid of uw oogwit

- Ernstige misselijkheid of braken
- Pijn aan de rechterkant van uw maag (buik)
- Een slaperig gevoel
- Donkere urine (de kleur van thee)
- Bloeding of gemakkelijkere blauwe plekken dan normaal
- Minder eetlust dan normaal

Hormoonklierproblemen

- Hoofdpijn die niet verdwijnt of ongebruikelijke hoofdpijn
- Snelle hartslag
- Meer zweten
- Het koud hebben
- Zich zeer moe voelen
- Duizelig of flauwvallen
- Gewichtstoename of gewichtsverlies
- Meer honger of dorst dan normaal
- Haaruitval
- Harde stoelgang
- Uw stem wordt dieper
- Zeer lage bloeddruk
- Vaker plassen dan normaal
- Misselijkheid of braken

- Maagpijn (buikpijn)
- Stemningswisselingen of gedragsverandering (zoals minder zin in seks, prikkelbaarheid of vergeetachtigheid)

Diabetes type 1

- Meer honger of dorst dan normaal
- Vaker moeten plassen
- Gewichtsverlies
- Vermoeidheid

Nierproblemen (nefritis en nierfalen)

- Minder vaak plassen dan normaal
- Bloed in de urine
- Gezwollen enkels
- Minder eetlust dan normaal

Infusiegerelateerde reacties (kunnen soms ernstig of levensbedreigend zijn)

- Koude rillingen
- Bibberen of koorts
- Jeuk of huiduitslag
- Een gloeiend of gezwollen gezicht

- Kortademig zijn of piepende ademhaling
- Duizeligheid of een gevoel van flauwvallen
- Rug- of nekpijn

Problemen in andere delen van het lichaam

- Hoofdpijn of stijve nek
- Koorts
- Zich moe of zwak voelen
- Verwardheid
- Geheugenproblemen of een slaperig gevoel
- Stuiptrekkingen (toevallen)
- Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
- Veranderingen in gezichtsvermogen
- Oogpijn of roodheid
- Ernstige spierzwakte
- Veranderingen in hartslag, zoals snel slaan of het schijnbaar overslaan van de hartslag of een bonzend gevoel
- Blauwe plekken op de huid of bloedingen