

Behandeling met **alemtuzumab** kan het risico verhogen op:

Auto-immuunaandoeningen:

- > Een bloedstollingsprobleem genaamd auto-immuuntrombocytopenische purpura (ITP)
- > Bepaalde nieraandoeningen; en
- > Schildklieraandoeningen

Ernstige infecties

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.sanofi.nl/geneesmiddelen/lemtrada. Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

		MS Verpleegkundige
		Huisarts
		Neuroloog
Telefoonnummer	Naam	

Handtekening van de patiënt: _____

Naam van de patiënt: _____

Mijn arts die alemtuzumab voorschrijft, kan op het onderstaande nummer bereikt worden. Andere artsen of medisch deskundigen die bij mijn verzorging en/of behandeling betrokken zijn, kunnen hier ook vermeld worden. Als er medische onderzoeken worden uitgevoerd, dan graag kopieën van alle medische dossiers, inclusief alle behandelingen en/of onderzoeksresultaten, aan de hieronder vermelde arts(en) verstrekken.

Patiëntenwaarschuwingskaart

Informatie voor patiënten die alemtuzumab (gaan) gebruiken.

Let op bij gebruik van alemtuzumab. Alemtuzumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed om welk medicijn dit gaat.

Laat deze kaart zien aan alle artsen, verpleegkundigen of andere zorgprofessionals die u behandelen ook in spoedgevallen.

Ik ben behandeld met **alemtuzumab**, een behandeling voor actieve Relapsing Multiple Sclerose (RRMS).

Ik neem deel aan een speciaal monitoringsprogramma, dat elke maand plaatsvindt gedurende 4 jaar na mijn laatste behandeling.

Belangrijke bijwerkingen waar u op moet letten:

Neem direct contact op met uw arts om deze symptomen te melden. Als u uw eigen arts niet kunt bereiken, moet u onmiddellijk andere medische hulp inschakelen.

Auto-immuunaandoeningen

Auto-immuuntrombocytopenische Purpura - ITP

- > Kleine verspreide vlekjes op uw huid die rood, roze of paars zijn
- > Snel blauwe plekken krijgen
- > Bloeding door een snijwond die moeilijker te stoppen is
- > Zwaardere, langere of frequentere menstruaties dan normaal
- > Bloedingen tussen uw menstruaties kunnen ook een teken van ITP zijn
- > Een bloedneus of bloeding van uw tandvlees die nieuw ontstaan is, of na een langere tijd dan gewoonlijk stopt
- > Bloed ophoesten

Nierproblemen of anti-GBM-ziekte

- > Bloed in de urine - deze kan rood of theekeurig zijn
- > Zwelling van uw benen of voeten
- > Bloed ophoesten

Ernstige infecties

Ook moet u uw dokter meteen informeren als u een of meer van deze symptomen van ernstige infectie krijgt

- > Koorts en/of koude rillingen
- > Gezwollen klieren
- > Kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, pijn op de borst of benauwdheid en bloed ophoesten

Auto-immuunaandoeningen kunnen optreden lang nadat u een behandelingskuur met alemtuzumab heeft ondergaan. **Het is heel belangrijk dat u blijft doorgaan met uw maandelijkse onderzoeken (ook als u zich goed voelt).**



U moet ook alert blijven op klachten en symptomen.



Blijf hiermee doorgaan gedurende 4 jaar na uw laatste behandelingskuur met alemtuzumab.



Vroege opsporing en diagnosestelling geven u de beste kans op verbetering en/of herstel.